

Matrices

Una matriz es un arreglo rectangular de números reales. Consideramos el conjunto $\mathbb{R}^{n \times m}$ de todas las matrices de n filas y m columnas (siempre anotamos *filas* \times *columnas* en ese orden). Mostramos algunos ejemplos:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 4}; \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 0 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}; \begin{pmatrix} 1 & -4 & 3 & 8 & 7 \\ -4 & -5 & -6 & 9 & 0 \\ 7 & 8 & 9 & 6 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 5}.$$

Distinguimos las *matrices fila* y las *matrices columna*:

$$(7 \ -2 \ 0 \ 4) \in \mathbb{R}^{1 \times 4}; (0 \ 1) \in \mathbb{R}^{1 \times 2}; \begin{pmatrix} 15 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 1}; \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 1}.$$

Las *matrices cuadradas* son aquellas que tienen la misma cantidad de filas que de columnas:

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & \sqrt{7} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}; \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ -2 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & -3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}; \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & -1 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$$

En cada conjunto $\mathbb{R}^{m \times n}$, tenemos la *matriz cero*, que notamos $\mathbb{O}_{m \times n}$. En $\mathbb{R}^{n \times n}$, la *matriz identidad*, por ejemplo:

$$\mathbb{I}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; \mathbb{I}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \mathbb{I}_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Estas matrices cumplirán un papel importante respecto de las operaciones entre matrices.

Para referirnos a los lugares de una matriz, usaremos subíndices dobles: el primero para indicar la fila y el segundo para la columna. Veamos un ejemplo,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -7 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 4 & 1 & 0 \\ 5 & -2 & 6 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{array}{l} a_{11} = 2 \text{ coeficiente de la fila 1 y la columna 1} \\ a_{23} = 4 \text{ coeficiente de la fila 2 y la columna 3} \\ a_{34} = 0 \text{ coeficiente de la fila 3 y la columna 4.} \end{array}$$

Operaciones con matrices

Suma y resta. La primera operación que presentamos es la suma (y la resta) de matrices de $\mathbb{R}^{m \times n}$, que se calcula lugar a lugar tal como para vectores.

Por ejemplo: si $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 0 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 10 & -2 \\ 1 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$ entonces,

$$A + B = \begin{pmatrix} 10+1 & 2+(-2) \\ -2+1 & 0+1 \\ 3+(-2) & 3+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 0 \\ -1 & 1 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}, \quad A - B = \begin{pmatrix} 10-1 & 2-(-2) \\ -2-1 & 0-1 \\ 3-(-2) & 3-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 4 \\ 5 & 0 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}.$$

Observamos que para poder sumar dos matrices A y B , deben tener la misma cantidad de filas y de columnas.

La matriz \mathbb{O} es elemento neutro de la suma de matrices, es decir $M + \mathbb{O} = M$ para cada matriz M .

Producto por un escalar. El producto de una matriz por un número real también se efectúa lugar a lugar, como en el caso de vectores. Por ejemplo, para las matrices A y B anteriores,

$$3A = \begin{pmatrix} 3 \cdot 1 & 3 \cdot 2 \\ 3 \cdot (-2) & 3 \cdot 0 \\ 3 \cdot 3 & 3 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ -6 & 0 \\ 9 & 9 \end{pmatrix}, \quad \frac{1}{2}B = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \cdot 10 & \frac{1}{2} \cdot (-2) \\ \frac{1}{2} \cdot 1 & \frac{1}{2} \cdot 1 \\ \frac{1}{2} \cdot (-2) & \frac{1}{2} \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -1 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}.$$

Producto de matrices. El producto $A \cdot B$ de dos matrices A y B está definido únicamente si la cantidad de columnas de A es igual a la cantidad de filas de B .

Por ejemplo, podremos calcularlo para $A \in \mathbb{R}^{1 \times 3}$ y $B \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$, una matriz fila por una matriz columna. Recurrimos al producto interno o producto escalar de \mathbb{R}^3 para definir este producto de matrices:

$$(1 \ 2 \ 3) \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = (1, 2, 3) \cdot (-1, 0, 2) = 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 2 = 5$$

Caso general:

si $A \in \mathbb{R}^{n \times k}$ y $B \in \mathbb{R}^{k \times m}$ podemos calcular $A \cdot B$, que será una matriz de tamaño $n \times m$.

Ejemplo 1. Sean

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 4 & -2 \end{pmatrix}_{2 \times 4}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}_{4 \times 3} \Rightarrow \text{se puede calcular } A \cdot B. \quad 2 \times 3$$

Para calcular $A \cdot B$, multiplicamos cada fila de A por cada columna de B ; más precisamente, para obtener el lugar ij de $A \cdot B$, multiplicamos la fila i de A por la columna j de B .

Por ejemplo, para obtener

el lugar 11 de $A \cdot B$, multiplicamos la fila 1 de A por la columna 1 de B ,
el lugar 12 de $A \cdot B$, multiplicamos la fila 1 de A por la columna 2 de B , etc.

De esta forma resulta

$$(A \cdot B)_{11} = (1 \ -1 \ 0 \ 2) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = (1, -1, 0, 2) \cdot (1, -1, 2, 0) = 2.$$

Continuamos calculando cada uno de los lugares de la matriz $A \cdot B$:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 4 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|c|c} 2 & & \\ \hline & & \\ \hline & & \end{array} \right)$$

$$(1, -1, 0, 2) \cdot (1, -1, 2, 0) = 2$$

Para obtener el elemento en la fila 1 columna 2 del producto multiplicamos la primera fila de A por la segunda columna de B , y queda

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 4 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|c|c} 2 & -1 & \\ \hline & & \\ \hline & & \end{array} \right)$$

$$(1, -1, 0, 2) \cdot (0, 1, 4, 0) = -1$$

Para obtener el elemento de la fila 1 columna 3, calculamos:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 4 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|c|c} 2 & -1 & 8 \\ \hline & & \\ \hline & & \end{array} \right)$$

$$(1, -1, 0, 2) \cdot (1, 3, 1, 5) = 8$$

Y ahora trabajamos con la segunda fila de A , para calcular similarmente los elementos de la segunda fila de $A \cdot B$:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 4 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|c|c} 2 & -1 & 8 \\ \hline 11 & & \\ \hline & & \end{array} \right)$$

$$(3, 0, 4, -2) \cdot (1, -1, 2, 0) = 11$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 4 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|c|c} 2 & -1 & 8 \\ \hline 11 & 16 & \\ \hline & & \end{array} \right)$$

$$(3, 0, 4, -2) \cdot (0, 1, 4, 0) = 16$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 4 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|c|c} 2 & -1 & 8 \\ \hline 11 & 16 & -3 \\ \hline & & \end{array} \right)$$

$$(3, 0, 4, -2) \cdot (1, 3, 1, 5) = -3$$

Hemos calculado:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 8 \\ 11 & 16 & -3 \end{pmatrix}.$$

Notemos que en este caso **no se puede calcular** (no está definido) el producto $B \cdot A$, ya que la cantidad de columnas de B no coincide con la cantidad de filas de A .

Observación. Al considerar la primera columna de B como una matriz de 4×1 y multiplicar resulta

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 4 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 11 \end{pmatrix}.$$

$2 \times 4 \qquad \qquad 4 \times 1 \qquad \qquad 2 \times 1$

De la misma manera, las demás columnas de $A \cdot B$ son el resultado del producto de A por la columna correspondiente de B :

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 4 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 16 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 4 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -3 \end{pmatrix}.$$

Ejemplo 2. Calcular el producto $M \cdot N$ y el producto $N \cdot M$ para

$$M = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Observemos que

$$M = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{podemos calcular } M \cdot N.$$

$2 \times 3 \qquad \qquad 3 \times 2 \qquad \qquad 2 \times 2$

Procedemos como en el ejemplo anterior:

$$M \cdot N = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & \quad \\ \quad & \quad \end{pmatrix}$$

$$M \cdot N = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ \quad & \quad \end{pmatrix}$$

$$M \cdot N = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 6 & \quad \end{pmatrix}$$

